

Antinflamatorios no esteroideos y paracetamol para aliviar el dolor tras el parto vaginal



En mujeres que requieren alivio del dolor después del parto vaginal, los antinflamatorios no esteroideos (AINE) podrían proporcionar mejor alivio del dolor que el placebo (certeza moderada). No está claro si el paracetamol es mejor que placebo y que los AINE para aliviar el dolor (certeza muy baja en ambos casos). Los AINE podrían disminuir la necesidad de alivio adicional del dolor en comparación con placebo (certeza baja). No está claro si el paracetamol disminuye esta necesidad en comparación con placebo (certeza muy baja). Ningún estudio que comparó paracetamol con AINE informó sobre la necesidad de alivio adicional del dolor. **FALTA EVIDENCIA**

Ningún estudio informó sobre los efectos de los analgésicos en la duración de la estancia hospitalaria materna ni las tasas de lactancia materna. **FALTA EVIDENCIA**



Puede haber poca diferencia entre AINE y placebo en el riesgo de episodios perjudiciales no deseados en la madre (certeza baja). No está claro si este riesgo es diferente entre paracetamol y placebo, ni entre paracetamol y los AINE (certeza muy baja en ambos casos). Ninguno de los estudios informó sobre los efectos de los analgésicos en el riesgo de episodios adversos no deseados en el recién nacido. **FALTA EVIDENCIA**



Revisión Cochrane (publicada en octubre de 2020); 13 estudios con 1023 mujeres que compararon AINE con placebo, paracetamol con placebo o paracetamol con AINE.

