



Prioridades ante la COVID-19

1 Manejo clínico

Cribado y pruebas

- Pruebas moleculares de laboratorio para el diagnóstico de infecciones por SARS-CoV-2
- Pruebas rápidas en el lugar de atención para el diagnóstico de infecciones por SARS-CoV-2
- Pruebas de anticuerpos para identificar infecciones por SARS-CoV-2 presentes y pasadas
- Signos y síntomas para determinar si un paciente que acude al médico de cabecera o al servicio de urgencias presenta COVID-19, neumonía por COVID-19 o neumonía por COVID-19 grave/síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) que requiera un ingreso en UCI

Pruebas de laboratorio sistemáticas para determinar si un paciente presenta neumonía por COVID-19 o infección por SARS-CoV-2

Pruebas de detección por la imagen para el diagnóstico de la COVID-19

Tratamiento farmacológico

- Cloroquina o hidroxicloroquina para pacientes con COVID-19
- Metanálisis en red activo: intervenciones farmacológicas para tratar a pacientes hospitalizados con COVID-19.
- Metanálisis en red activos: intervenciones farmacológicas para tratar a pacientes no hospitalizados con COVID-19.

Cuidados críticos

¿Cuál es el efecto del uso profiláctico de anticoagulantes en la evolución clínica de pacientes ingresados en la UCI con COVID-19?

Profilaxis

Metanálisis en red activo: intervenciones farmacológicas para prevenir la infección de contactos cercanos de pacientes con COVID-19.

Pronóstico

Modelos predictivos para el diagnóstico y el pronóstico de la infección por COVID-19: revisión sistemática y lectura crítica (publicación conjunta como revisión sistemática activa de BMJ/Cochrane)

¿La obesidad aumenta independientemente el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y de COVID-19 grave y la mortalidad?

Manejo clínico de las repercusiones de la pandemia sobre la salud

Consecuencias a largo plazo del confinamiento, el aislamiento social y la cuarentena sobre la salud mental

Violencia doméstica y machista relacionada con la respuesta a la pandemia

2 Medidas de salud pública

Prevención de la infección

- Efectividad de las tecnologías de rastreo de contactos en epidemias.
- Desinfección de sistemas de transporte público para el control de la COVID-19.

Protección personal

¿La reutilización o el uso extenso de mascarillas N95 afecta a su efectividad y seguridad en comparación con un solo uso en contextos de asistencia sanitaria?

Intervenciones para apoyar la resiliencia y la salud mental del personal de asistencia sanitaria y social de primera línea durante una crisis de salud mundial y la desescalada posterior

¿Cuáles son los efectos perjudiciales sobre las poblaciones vulnerables de las medidas de salud pública para prevenir la propagación de la COVID-19?

3 Respuesta económica y social

Repercusión de la COVID-19 sobre la pobreza alimentaria en niños y madres

¿Cómo repercuten los determinantes sociales de la salud (ingresos, empleo, vivienda, seguridad alimentaria, raza y conexión social) sobre los resultados en salud para las personas diagnosticadas de COVID-19?

**Evidencia fiable.
Decisiones informadas.
Mejor salud.**